

2021年6月5日

日本オリンピック委員会の皆さん、

私たちは、COVID-19 に対する効果的なプロトコルを開発している最前線の医師のグループとして、今日、COVID-19 感染の最近の急増の結果として夏のオリンピックへの潜在的な影響に関して、あなた方が直面しているジレンマについて、皆さんに手紙を書いています。私たちは、第 32 回オリンピックが無事に開催されるための真の希望を提供したいと思います。この希望は、強力で再現可能な医学的証拠と査読済みの科学データによって十分に裏付けられています。

多くの世界的な医療当局や主要メディアは、メキシコ、インド、その他多くの国の医師が Covid-19 の流行を迅速に鎮圧し、都市や町を旅行や社会的で娯楽的な集まりを安全にするために行った研究と現実世界の結果を共有または報告していません。

東京オリンピックの開幕まで残るところ 6 週間という短い期間ですが、以下に概説する行動計画により、現在の日本での COVID-19 の急増を数日以内に制御できる可能性が非常に高いと考えています。私たちと世界中のアライアンス アソシエイトは、支援する準備ができています。

イベルメクチンを中心としたプロトコルにビタミンを加えたものにより、病気のすべての段階を予防・治療できることが、何十もの査読を経た研究成果で明らかになっています。この非常に安全で、効果的で、安価で、広く入手可能な薬剤は、ノーベル賞を受賞した優秀な日本の研究者によって約 50 年前に世界に与えられたものであり、今回のパンデミックにおいて、何十万人もの COVID-19 患者とその家族に救命効果をもたらしたことは、世界的に評価されるべきものです。イベルメクチンが広く配布されると、プログラム開始後 10 日以内に感染者数と死亡者数が劇的に減少します。これは、メキシコ、インド、ペルー、ブラジルなどの国々で起きた結果です。包括的な疫学的分析と科学研究については、[flccc.net](http://flccc.net) をご覧ください。予防と早期治療のプロトコルを本状に添付いたします。

世界の目が東京に向けられている今、日本のリーダーであるあなたには、パンデミックから抜け出し、本来の姿であるオリンピックの栄光を世界に示すチャンスです。

敬具

COVID-19 の救命救急の最前線にいる医師たち  
FLCCC Alliance 会長 Pierre Kory 博士

## I-MASS

### Prevention & At Home Treatment Mass Distribution Protocol for COVID-19

#### 予防プロトコル

18歳以上で40kg(90lbs)以上の成人

イベルメクチン 18mg 錠; 治療開始初日 1回, 後は毎週(7日ごと)

ビタミンD3 2,000 IU (50  $\mu$ g); 毎日

複合ビタミン 1錠; 毎日

デジタル体温計: オptional(体温測定用)

#### 早期自宅療養プロトコル

18歳以上で40kg(90lbs)以上の成人

イベルメクチン 18mg 錠; 毎日1回, 5日間

メラトニン 6mg; 就寝前, 5日間

アスピリン 80mg; 毎日(禁忌を除く)

殺菌含嗽 1日3回(飲み込まずに嗽をする); 可能な場合

#### 曝露後予防

COVID-19患者の家族または濃厚接触者

イベルメクチン 18mg 錠 1回, 48時間以内に繰り返す

A cooperation of the  
FLCCC Alliance with

**BIRD**   
British Ivermectin Recommendation Development  
[www.bird-group.org](http://www.bird-group.org)

I-MASS プロトコルは、地域的に発生した場合や資源の乏しい国での資源の乏しい国において、COVID-19の影響と拡散を軽減する目的で、大量配布のために開発されました。

イベルメクチン

イベルメクチンは非常に強力な抗ウイルス性および抗炎症性を有することが判明しており、イベルメクチンを採用した国の多くのランダム化試験およびデータはすべて、回復、入院、および死亡までの時間の大幅な短縮を示しています。それらのデータを要約した FLCCC の総説は、*American Journal of Therapeutic* に掲載 ([www.bit.ly/3vORJUU](http://www.bit.ly/3vORJUU))されています。

その他のサポート情報は、こちらをご参照ください:

[www.flccc.net/ivermectin-in-covid-19/](http://www.flccc.net/ivermectin-in-covid-19/)

免責事項: 妊娠中のイベルメクチンの安全性は確立されていません。特に、妊娠第1期に使用する場合は、事前に医師と相談してください。

さらなる COVID-19 の治療プロトコルは、入院中の患者さんを含めて以下をご覧ください。 [flccc.net/covid-19-protocols/](http://flccc.net/covid-19-protocols/)